

**Composição**

10 ml contêm: Belladonna D30 1 ml, Bufo D200 1 ml, Cuprum metallicum D12 1 ml, Silicea D30 1 ml, Zincum metallicum D12 1 ml, Ethanolum/Aqua purificata. Preparado segundo as normas da Farmacopeia Homeopática Alemã.
Contém 37% Álcool.

Dosagem e Administração

Salvo outra indicação, a dose para adultos é de 5 a 10 gotas, diluídas ou não num pouco de água, 1 vez por dia, 30 minutos antes de uma refeição. Após melhoria da sintomatologia, reduzir a administração para uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Crianças maiores de 12 anos, é de 5 a 8 gotas, diluídas em meio copo de água que se vai bebendo aos tragos durante o dia; deve evitar-se a sua mistura com alimentos. Após melhoria da sintomatologia, é de 5 a 8 gotas todas as semanas ou quinzenalmente.

N.B. Não está prevista a utilização deste produto em crianças menores de 12 anos.

Indicações de Bom Uso

Baseiam-se nas utilizações tradicionais de cada um dos componentes homeopáticos. Entre elas incluem-se:

epilepsia, irritabilidade, câibras, tiques, tremor das pálpebras, convulsões, tetanias, síndrome das pernas agitadas.

Advertências

Não se conhecem.

Anotação

Conforme o estado do paciente podem ser administrados, simultânea ou intercaladamente, os seguintes complexos:

Histerismo: R14; Rekin14; R47

Insónia: R14; Rekin14; R47

Rendimento escolar deficiente: VC15 forte neo; Vita-C15 neo; R26; R29; R36; R54; Rekin54; R95

Síndrome das pernas agitadas: R36

Apresentação

Frasco de vidro de 50 ml.



Modo de Acção dos Componentes do Complexo Homeopático R33

- **Belladonna:** tiques; hiperestesia dos sentidos (ruídos...); pode ter convulsões (ou cólicas) desencadeadas pela luz; convulsões e delírios febris (alucinações de animais e monstros); mioclonias (tremores musculares) e sobressaltos, mesmo a dormir; congestão facial, pele com cor vermelha, sudação intensa e mucosas secas; dores pulsáteis; tetanias.
- **Bufo:** agressividade (até morde) e irritação produzida pela música; as crianças levam amiúde as mãos aos órgãos genitais e os adolescentes masturbam-se muito; excitação sexual nas menstruações; deterioração das faculdades mentais (até para imbecilidade); antes das convulsões surge uma agitação e posteriormente cai num sono profundo; impotência; dermatoses com linfangite.
- **Cuprum metallicum:** tiques dolorosos da face (pálpebras tremem), câibras (até nas relações sexuais); espasmos, convulsões, soluços, aparecem e desaparecem bruscamente, agravados pelo frio, noitadas e esforços intelectuais; cólicas das crianças quando acompanhadas de soluços; melhoram bebendo água fria; intolerância aos DIU (dispositivos intra-uterinos) de cobre (cólicas); aterosclerose.
- **Silicea:** irritabilidade (nervosos, agitados), hiperestesia psíquica e sensorial (sobressalto ao menor barulho); tímidos, medrosos, teimosos, com falta de confiança em si próprio (medo de falhar), não gostam que lhe toquem; magro com apetite, sua mesmo com frio, apesar de friorento (em especial na cabeça); suor dos pés que podem ter mau cheiro; fobia das agulhas; intolerância às bebidas alcoólicas; tendência para supurações; melhora com o calor e roupa quente.
- **Zincum metallicum:** enfraquecimento das funções intelectuais (compreensão e memorização difíceis); fadiga geral, mas hiper-excitabilidade nervosa com agitação das pernas e pés (não pára de as mexer) especialmente durante as insónias; grita durante o sono; agravamento dos tremores, cefaleias e náuseas com vinho, bebidas alcoólicas em geral, medicamentos sedativos, café e com barulho; urina melhor sentado ou inclinado/a para trás; as mulheres melhoram nas menstruações; formigueiros e sensação de encortijamento ou insectos a andar na pele; movimentos da cabeça durante a febre; convulsões; tonturas ao acordar; após stress emocional, ou supressão de erupções cutâneas (por exemplo após utilização de corticosteróides).

Efeitos secundários

Não se conhecem.

Interações medicamentosas e outras

Não se conhecem.